


CRITICAL+ 2.0


THC + THCA		CBD + CBDA	
19,73 %		0,05 %	
CBDV		THCV	
<0,1 %		<0,1 %	
CBC		CBG	CBN
0,33 %		0,49 %	<0,1 %
Somma totale di cannabinoidi*			20,78 %



*La cannabis contiene almeno 113 cannabinoidi in forma acida o neutra. Quando il campione viene riscaldato (fumo, vapore, cottura...) gli acidi si decarbossilano e diventano neutri. Nel presente rapporto, sono stati considerati i principali cannabinoidi, acidi e neutri, di questa genetica.

TERPENI

 b-caryophyllene	 β-Myrcene
 α-Pinene	 trans-nerolidol
 Limonene	 Linalool
 α-Humulene	 sabinene
 β-pinene	 Fenchol



Somma totale di terpeni*: **1,70 %**

*La cannabis contiene più di 100 terpeni. Oltre a determinare l'aroma e il sapore delle diverse varietà, questi composti possono interagire con i cannabinoidi. Nel presente rapporto, sono stati considerati i 10 principali terpeni di questa genetica.

*Risultati ottenuti mediante cromatografia liquida accoppiata a un rivelatore UV-visibile (HPLC-UV/VIS) per l'identificazione di cannabinoidi e mediante gascromatografia accoppiata a un rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) per l'ottenimento di terpeni. L'apparecchiatura è stata precedentemente calibrata e sottoposta a rigorosi test di controllo della qualità per garantire la precisione dei risultati. I dati qui presentati corrispondono alla media dei campioni esaminati, i quali provengono da parecchie piante coltivate dal seme da diversi produttori.



Le informazioni contenute in questa relazione sono state raccolte in piena conformità con i requisiti definiti dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il Controllo della Droga e la Prevenzione del Crimine (UNODC) nel manuale Metodi Consigliati per l'Identificazione e l'Analisi della Cannabis e dei Prodotti dalla Cannabis. Con la presente dichiariamo che le informazioni contenute in questo report sono state riviste per esattezza e confrontate con i requisiti del controllo di qualità fissati per ogni metodo.



Oier Aizpurua, PhD



Pierre-Antoine Aulas